Atteinte œsophagienne dans la sclérodermie systémique : analyse comparative entre patients asymptomatiques et symptomatiques

Faten GHRAB, Interne, Service de gastro-entérologie A, Hôpital universitaire La Rabta, Tunis, Tunisie
Taysir Ben Achour (2) ; Sarra Laabidi (1) ; Fatma Saïd (2) ; Donia GOUIAA (1) ; Ines Naceur (2) ; Sahar Chtioui (1) ; Lilia Zouiten (1) ; Nadia Ben Mustapha (1) ; Mayssam Jridi (2) ; Meriem Serghini (1) ; Monia Smiti (2) ; Asma Labidi (1) ; Monia Fekih (1)
- (1) Service de gastro-entérologie A, Hôpital universitaire La Rabta, Tunis, Tunisie
- (2) Service de médecine interne, Hôpital universitaire La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction:
- La sclérodermie systémique (SSc): maladie auto-immune rare avec fibrose multisystémique.
- L'atteinte œsophagienne: manifestation digestive la plus fréquente, souvent silencieuse.
- Le dépistage précoce des troubles moteurs → prévention des complications.
- *Objectif de l'étude:* comparer les anomalies manométriques et les symptômes digestifs chez les patients asymptomatiques vs symptomatiques.

Matériels et méthodes:
- Étude rétrospective bicentrique (2004–2024), en service de médecine interne.
- Population :
  *patients asymptomatiques,
  *patients avec ≥1 symptôme digestif (RGO, dysphagie, épigastralgie…).
- Données recueillies : cliniques, endoscopiques, manométriques (réalisées au service d'hépato-gastro-entérologie).
- Analyse statistique : descriptive + analytique (logiciel SPSS), test du Khi², seuil de significativité $p < 0,05$.

Résultats:
- *Caractéristiques générales :*
  *160 patients inclus.
  *Prédominance féminine : 91,2% (H/F = 0,1).
  *Âge moyen : 50,6 ans (13–81 ans).
- *Patients symptomatiques (n = 113) :*
  *Symptômes dominants : RGO (52,5 %), dysphagie (41,3 %).
  *Endoscopie (52,5 %) : anomalies dans 32,5 % (œsophagite 12,5 %, gastropathie congestive 6,9 %).
  *Manométrie œsophagienne (36,2 %) : anomalies dans 23,8 %:
  - Hypotonie du SIO : 15,6 %
  - Apéristaltisme : 8,8 %
  - Motilité inefficace : 2,5 %
  - Hypocontractilité : 1,9 %



Figure 1: Manifestations cliniques

- *Patients asymptomatiques (n = 47) :*
  *Manométrie systématique.
  *Motilité normale: 14,9 % des patients.
  *Anomalies motrices:
  - Hypotonie du SIO : 44,7 %
  - Motilité inefficace : 21,3 %
  - Apéristaltisme : 19,1 %



Figure 2 : Résultats de la manométrie œsophagienne chez les patients symptomatiques VS asymptomatiques

-Corrélation significative entre la forme diffuse de SSc et l'hypotonie du SIO ($p < 0,05$).

Conclusion:
- L'atteinte fonctionnelle œsophagienne est fréquente chez les patients symptomatiques et asymptomatiques.
- Importance du dépistage systématique, surtout par manométrie, même sans symptômes.
- Détection précoce des troubles moteurs → prévention des complications et optimisation de la prise en charge.