MALADIES INFECTIEUSES

CA 174

Une éruption urticarienne prurigineuse : penser à la vascularite urticarienne scabieuse

1er Auteur : Hicham, MOKHTARI, Interne, Dermatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE

Autres auteurs, équipe:

- Malek, BEN SLIMANE, AHU, Dermatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE
- Hazem, SEHWEIL, Interne, Dermatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE
- Kahena, JABER, Professeur, Dermatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE
- Raouf, DHAOUI, Professeur, Dermatologie, Hôpital Militaire de Tunis, Tunis, TUNISIE

Introduction

La gale est une ectoparasitose humaine stricte très contagieuse imputée à l'acarien *Sarcoptes scabiei var hominis*. Les manifestations classiques de cette maladie comportent une éruption papuleuse prurigineuse associée à des sillons scabieux. Les présentations atypiques de la gale sont d'autant plus nombreuses que l'incidence globale de la maladie augmente. Nous rapportons un cas de vascularite urticarienne scabieuse.

Observation

- Femme de 55 ans aux antécédents de diabète de type 2.
- Depuis 3 semaines : éruption généralisée prurigineuse ne s'améliorant pas sous antihistaminiques.
- Absence de prise médicamenteuse récente.
- À l'examen : plaques urticariennes non fugaces + excoriations en regard des bras, région péri-aréolaire, tronc, organes génitaux externes et cuisses.
- Biopsie cutanée : vascularite leucocytoclasique.
- Sérologies virales et examens immunologiques : négatifs.
- Prurit similaire chez le fils avec à l'examen cutané présence de sillons et nodules scabieux.
- Présentation anamnestico-clinico-histologique en faveur d'une vascularite urticarienne scabieuse.
- Traitement topique par benzoate de benzyle : nette régression des plaques urticariennes + résolution de sa gale sans récidive à 6 mois de contrôle.

Figure A : Plaques papuleuses érythémato-oedématiées urticariennes du membre supérieur gauche

Discussion

- Causes fréquentes de vascularite urticarienne :

a. Idiopathique.
b. affection auto-immune.
c. épisode infectieux.
d. prise médicamenteuse.

- L'association entre gale et vascularite est très rarement rapportée dans la littérature.
- Pathogénie probable : sarcoptes scabieux déclenchent une vascularite par hypersensibilité humorale et formation de complexes immuns circulants.
- Cette présentation rare et atypique de la gale peut être une source d'errance diagnostique.

Figure B : Plaques papuleuses érythémato-oedématiées urticariennes de la région glutéale gauche.

Messages-clés

- Les éléments devant orienter vers une vascularite scabieuse sont :

I. bilan de vascularite négatif.
II. contage familial de gale.
III. résolution suite à un traitement scabieux.